

présent, observé chez aucune autre, et n'en ai non plus trouvé aucune citation.

DESCRIPTION de quelques Mollusques nouveaux ou présumés tels, par M. AL. BONNET, ancien conseiller d'État, à Genève.

HELIX BROTHI. Bonnet, pl. V, f. 1. — Coquille globuleuse à ombilic presque nul, très-finement striée et obliquement dans le sens de la hauteur, assez épaisse et luisante; sa couleur générale, d'un blanc opaque légèrement jaunâtre, est plus claire vers le sommet de la spire et un peu violacée vers cette dernière partie, plus pâle à la face ombilicale : trois bandes spirales d'un brun foncé également espacées et de la même largeur se remarquent sur le dessus de la coquille et sur le premier tour; une, légèrement plus pâle, sur le second; enfin une autre bande d'un fauve clair sur le troisième : spire conoïde, assez obtuse, composée de six tours arrondis, séparés par une suture bien marquée; ouverture simple, légèrement colorée de jaunâtre, et laissant assez voir, par transparence, les bandes brunes externes; bord columellaire blanchâtre se repliant un peu de manière à former un très-petit ombilic.

Hauteur totale, 31 mill.; le plus grand diamètre, 33 mill.; le plus petit, 30. Ouverture, 14 mill. de hauteur sur 20 mill. de large.

Habite Borneo. Je possède deux exemplaires de cette espèce dont un jeune a la coloration de l'intérieur de la bouche complètement blanche.

HELIX SINISTRA. B., pl. V, f. 2. — Coquille semi-globuleuse, légèrement aplatie et assez obtuse, à très-petit ombilic; pourvue d'une carène plus ou moins aiguë, peu saillante; test assez mince, peu luisant, finement chagriné sur les tours de spire et plus fortement sur la face

ombilicale; d'une couleur châtaigne foncée rougeâtre sur la partie inférieure de la carène et beaucoup plus claire et légèrement carminée vers le sommet de la coquille; cette teinte se modifie en une couleur jaune clair légèrement verdâtre vers le commencement de chaque tour; cette bande diminue de largeur et finit par disparaître vers le sommet. Spire composée de sept tours légèrement arrondis, à suture assez marquée; le premier est caréné, un peu moins convexe en dessus qu'en dessous; ouverture à gauche simple, d'un brun rouge par transparence, plus large que haute, assez bâillante à sa partie inférieure et convexe à la supérieure; la carène se faisant très-bien sentir dans l'intérieur par le contraste de la couleur brune et la bande jaunâtre; face ombilicale bombée à ombilic creusé en entonnoir et très-petit; bord columellaire presque nul et légèrement coloré de jaunâtre.

Hauteur, 20 mill.; plus grand diamètre, 32 mill.; plus petit, 29; bouche, 16 mill. de largeur sur 6 de hauteur.

Habite Borneo. J'ai un exemplaire de cette espèce dont la coloration est beaucoup moins vive que dans l'échantillon figuré.

HELIX VITREA. B., pl. V, f. 3. — Jolie petite espèce à coquille imperforée, assez aplatie, trochiforme; pourvue d'une carène saillante très-aiguë et tranchante, avec de fines stries obliques que croisent d'autres stries spirales, que l'on ne voit presque qu'à l'aide d'une loupe, et disparaissant complètement vers le sommet de la spire: le test est très-mince, diaphane, assez luisant, beaucoup moins en dessus de la carène qu'à la face ombilicale; d'une couleur fauve clair, uniforme sur toute la surface de la coquille, sauf le bord inférieur de chaque tour, à la suture, qui est marqué par une petite bande brune assez peu distincte, beaucoup plus chez les jeunes: spire composée de sept tours légèrement convexes; le premier est fortement caréné vers son milieu; la partie supérieure un peu convexe et le bord inférieur obliquement arrondi:

bouche simple, étroite, inégale, beaucoup plus large que haute, légèrement bâillante à sa partie inférieure; bord columellaire nul; face ombilicale un peu bombée, très-luisante avec de fines stries rayonnantes.

Hauteur, 7 mill.; plus grand diamètre, 17 mill.; le plus petit, 15; hauteur de l'ouverture, 7 mill. sur 3 de large.

Habite l'Amérique du Sud.

BULIMUS PICTUS. B., pl. V, f. 4, 5, 6, et pl. VI, f. 1. — Cette belle espèce est très-variable; le type est de forme assez allongée et a le facies de la plupart des *Bulimes*, presque lisse, avec quelques fines stries plus ou moins effacées; le test est peu épais, transparent, d'un blanc légèrement jaunâtre, quelquefois légèrement violacé, surtout vers le sommet de la spire; sept bandes spirales, d'un brun noirâtre, se remarquent sur le premier tour; trois d'entre elles, situées vers le bord inférieur, sont assez larges et inégalement espacées; l'intervalle entre la première et la seconde plus grand qu'entre celle-ci et la troisième; enfin les quatre autres sont interrompues, formant des lignes de points brun noir unis quelquefois par une légère bande fauve clair; du reste, ces particularités diffèrent assez suivant les échantillons; quelquefois ces taches sont peu nombreuses ou disparaissent complètement, le sommet de la coquille en est toujours dépourvu; spire conoïde légèrement obtuse au sommet, composée de sept à huit tours arrondis séparés par une suture bien marquée; bouche simple transparente; les bandes et les points bien marqués à l'intérieur, légèrement coloré de brun jaunâtre; la columelle blanchâtre ou quelquefois rosée se repliant un peu et formant un ombilic bien prononcé.

Cette espèce a la partie du test comprise entre la bande brune inférieure et le bord de la bouche très-variable de la teinte générale de la coquille; elle devient brique ou violacée, suivant les individus; cette coloration persiste aussi dans la bouche; quelquefois l'intervalle entre la

deuxième et la troisième bande est aussi de la même couleur.

VAR. A, pl. V, f. 6. — D'un jaune paille plus clair vers le sommet de la spire; les bandes, les points et la coloration présentent les mêmes particularités que le type.

VAR. B, pl. VI, f. 1. — Cette variété se remarque, dès le premier abord, par une différence assez notable; elle possède les mêmes trois bandes brunes spirales; mais ce qui la distingue le plus, ce sont des bandes verticales également de la même couleur plus ou moins espacées, occupant à peu près le centre du premier tour; quelquefois elles sont mêlées avec d'autres bandes d'un fauve plus ou moins foncé et en plus grand nombre, suivant les individus; l'ombilic et la columelle présentent aussi les mêmes particularités que dans les deux variétés précédentes.

Hauteur, 32 mill.; largeur du premier tour, 17; hauteur de la bouche, 16 mill.; sur 6 de large. Ces dimensions sont assez variables.

Habite le Pérou.

BULIMUS AMOENUS. B., pl. VI, f. 2. — Coquille assez allongée, se rapprochant beaucoup, pour le facies, du *bulimus radiatus*, très-mince, transparente et peu luisante; elle est d'une couleur légèrement fauve plus foncée et un peu violacée au sommet de la spire; une large bande d'un brun plus ou moins foncé et marqué contourne le bord inférieur du premier tour et en occupe presque la moitié; des bandes verticales irrégulières et assez espacées, d'un brun clair, se remarquent presque sur toute la surface de la coquille, sauf les deux ou trois derniers tours qui en sont dépourvus; les intervalles de ces bandes sont remplis par des lignes également de la même couleur, formant des stries assez fines. Spire composée de sept à huit tours légèrement arrondis et à sutures assez marquées, le premier étant assez allongé et peu renflé; bouche très-transparente, d'une teinte brun clair, les bandes et les

stries externes assez marquées à l'intérieur; péristome plus ou moins prononcé, médiocrement réfléchi, ensuite plus sensiblement et plus largement jusqu'au bord columellaire, où il se replie un peu de manière à former un ombilic assez profond.

Hauteur totale, 26 mill.; largeur, 11; hauteur de la bouche, 12 mill. sur 7 de large.

Habite le Pérou.

PUPA VARIUS. B., pl. VI, f. 3-4. — Coquille cylindrique fortement obtuse au sommet, striée par des petites lames assez fortes, également espacées, devenant de plus en plus fines vers le sommet et disparaissant complètement vers les deux ou trois derniers tours; assez épaisse, opaque et légèrement luisante; la coloration de cette espèce est très-variée, la teinte générale est d'un blanc de lait un peu bleuâtre, surtout vers le sommet; des taches d'un brun noirâtre plus ou moins grandes, ne formant quelquefois que des points, se trouvent presque sur toute la surface du test; elles sont mélangées par d'autres d'un fauve plus ou moins foncé; les taches brunes sont aussi quelquefois entourées d'une zone de la même couleur; spire composée de dix à onze tours légèrement arrondis, à sutures un peu onduleuses bien marquées; les lames, légèrement obliques dans le sens de la hauteur, le deviennent quelquefois beaucoup plus vers le sommet; bouche assez petite par rapport à l'ensemble de la coquille, à bords épais rabattus sensiblement et formant un péristome bien prononcé; intérieur d'un brun noirâtre légèrement transparent, les stries de l'extérieur ne se voyant que faiblement; dents columellaires au nombre de deux, dont une assez forte vers le milieu supérieur de la bouche, et une autre plus ou moins marquée, suivant les échantillons, se trouve vers le milieu du bord latéral gauche de l'ouverture; ombilic assez prononcé.

Hauteur, 25 mill.; hauteur de la bouche, 9 mill. sur 7 de large.

Habite la Tasmanie. *See Antilles.*

La forme de cette espèce est assez variable; j'en possède de plus ou moins renflées.

FISSURELLA TASMANIENSIS. B., pl. VI, f. 5. — Coquille ovale plus large et plus bombée à sa partie supérieure et bâillante à la partie inférieure, striée finement et inégalement dans le sens de son contour, avec quelques sillons plus ou moins marqués; ces stries deviennent beaucoup plus fines et régulières au sommet; assez luisante et très-épaisse; d'une couleur générale d'un blanc légèrement jaune rougeâtre et un peu violacé vers l'extrémité, avec dix-huit bandes rayonnantes, plus ou moins larges, inégalement espacées, d'un rouge mercure clair, dont dix à la partie supérieure et huit à l'inférieure; du reste, le nombre est assez variable; le dessous est largement ouvert, d'un blanc opaque avec quelques fines stries renforcées d'un épaississement très-prononcé vers le bas de la coquille; cette doublure est beaucoup plus forte à la partie supérieure, tandis qu'elle est presque nulle à l'inférieure; elle est tachée irrégulièrement de brunâtre plus ou moins foncé; le trou perforant est ovale, un peu irrégulier et très-épais sur ses bords.

Longueur, 31 mill.; largeur de la partie supérieure, 26 mill.; l'inférieure, 22; trou perforant, 6 mill. de hauteur sur 3 de large.

Habite la Tasmanie.

NOTE sur les genres DROMICA, TRICONDYLA et COLLYRIS,
par M. DE CHAUDOIR. — (Suite, voir p. 37.)

16. DR. ELEGANTULA (*Cosmema*), Boheman, *Ins. Afr.*, I, p. 24, n° 25. Natal.

17. DR. FURCATA (*Cosmema*), Boheman, *l. c.*, p. 21, n° 22. L'exemplaire de cette belle espèce, que je possède, m'a été cédé par M. le docteur Schaum.